

Coffeïne drank 10mg/ml, 60ml

Het werkzame middel in dit medicijn is coffeïne. In elke ml zit 10 mg coffeïne.

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

Onderbreking van de ademhaling (apneu) bij te vroeg geboren baby's.

Hoe dit medicijn werkt

Het stimuleert de ademhaling.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

De drank wordt toegediend via een buisje door de neus naar de maag (sonde).

Gebruikelijke doseringen:

De arts houdt bij de dosering rekening met het lichaamsgewicht.

Wanneer begint de werking?:

De werking begint binnen enkele minuten.

Belangrijke informatie

Gebruik bij andere ziekten of klachten:

*Let op bij:

- epilepsie.
- aandoening van het hart.
- maagproblemen.

Overleg hierover met de verpleegkundige of arts.

Bijwerkingen:

*Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

- te hoog suikergehalte in het bloed.

- te snelle hartslag.

- trekkingen van de spieren (convulsies).

* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden

Gebruik met andere geneesmiddelen:

- sommige antibiotica, zoals ciprofloxacin, norfloxacin en piperidinezuur.

Overleg hierover met de verpleegkundige of arts.
