

Metoprolol capsule 5 mg Rad

Het werkzame middel in dit medicijn is metoprolol. In elke capsule zit 5 mg metoprolol(-tartraat).

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

Kinderen met verschillende hartklachten namelijk:

- hoge bloeddruk
- minder goed pompen van het hart (hartfalen)

Hoe dit medicijn werkt

Dit middel werkt op verschillende manieren:

- verlaagt en de regelt de hartslag
- verlaagt de bloeddruk

Hierdoor gebruikt het hart minder zuurstof

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

* Baby's

Voor baby's die nog flesvoeding of borstvoeding krijgen: Meng de inhoud van de capsules met ongeveer 15 ml voeding. Bij borstvoeding eerst deze hoeveelheid afkolven. Geef eerst de voeding met de opgeloste capsule. Geef daarna de rest van de voeding. De kans dat alles wordt ingenomen is dan groter.

* Kinderen

De capsules doorslikken met een half glas water, limonade of vruchtensap.

Bij slikproblemen mogen de capsules worden opengemaakt. Meng de inhoud van de capsules met een beetje water, limonade of appelsap.

* Sondevoeding

De inhoud van de capsules zo nodig met de sondevoeding mengen. Volg daarbij de instructie van de arts of de verpleegkundige.

* Hoe lang gebruiken

Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal jarenlang. Dit is nodig om de kans op (latere) problemen met hart- en bloedvaten te verminderen.

* Stoppen met het gebruik

Bij plotseling stoppen na lang gebruik kunnen klachten ontstaan zoals: zweten, trillen, pijn op de borst en hele hoge bloeddruk. Stop daarom nooit zonder overleg met de arts. Meestal verlaagt de arts de dosering langzaam in 1 tot 2 weken.

Gebruikelijke doseringen:

* Bij hartfalen

Kinderen vanaf 2 jaar: de kinder-cardioloog houdt rekening met het gewicht.

In onderzoeken begint de arts met 2 keer per dag 0,1 mg per kilo lichaamsgewicht. De arts verhoogt daarna de dosering tot een halve tot 2,3 mg per kilo. Bijvoorbeeld voor een kind van 10 kilo is dit 1 tot 4 capsules per dag.

* Bij hoge bloeddruk

Kinderen tot 12 jaar: de arts verhoogt de dosering langzaam.

Meestal tot 2 keer per dag een halve tot anderhalve mg per kilo lichaamsgewicht. Voor een kind van 10 kilo is dit bijvoorbeeld 2 keer per dag 1 tot 3 capsules.

Dosering vergeten?:

Is de normale tijd minder dan 4 uur geleden? Neem de vergeten dosering alsnog in. Is het langer dan 4 uur geleden? Sla dan de vergeten dosering over.

Wanneer begint de werking?:

De werking begint binnen 2 uur.

Na 2 tot 4 weken is te meten hoeveel de bloeddruk is gedaald.

Belangrijke informatie**Niet gebruiken bij:**

Een aangeboren ziekte met een te snelle hartslag (Wolff Parkinson White syndroom), behalve als de cardioloog dit middel voorschrijft.

Gebruik bij andere ziekten of klachten:

* Let op bij

- astma of COPD (chronische longziekte)
- een te langzame hartslag
- een huidziekte met een te snel schilferende huid (psoriasis)
- sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming (bijvoorbeeld Myasthenia gravis)
- aanvallen van slechte doorbloeding van vingers en tenen. Bijvoorbeeld door kou of emoties (fenomeen van Raynaud)
- een ziekte met droge ogen, mond en slijmvliezen (syndroom van Sjögren)

Overleg met de verpleegkundige of arts als de klachten erger worden.

* Let ook op bij

- vastgesteld hartfalen (minder goed pompen van het hart). Meestal wordt dan begonnen met een lage dosering.
- vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de verpleegkundige of arts of u dit middel kunt gebruiken.
- etalage benen of vernauwing van een bloedvat in een been in het verleden. Overleg met de arts als opnieuw klachten ontstaan of klachten erger worden.

Bijwerkingen:

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

* Vooral bij het overeind komen kunt u zich duizelig voelen.

Langzamer opstaan kan helpen om duizelig worden te voorkomen.

* Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:

- koude handen of voeten
- snel moe of benauwd zijn bij inspanning
- hartkloppingen
- hoofdpijn
- buikpijn, misselijk zijn
- diarree, verstopping

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

* Door gebruik van dit medicijn kan de hartslag langzamer zijn. Overleg dan met de arts. De arts kan de dosering zo nodig verlagen.

* Seksuele problemen (impotent zijn) kunnen voorkomen.

Bespreek dit dan bij een volgend bezoek met de arts.

* De volgende bijwerkingen komen vooral voor na lang gebruik:

- licht gevoel in het hoofd
- slaap problemen
- vreemd dromen of nachtmerries.

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

* Ook het zien of horen van dingen die er niet zijn komt voor na lang gebruik. Waarschuw dan meteen de arts.

* Zelden kan somber zijn voorkomen. Overleg dan met de arts.

* Krijgt u dit middel bij hartfalen? Dan kan het vasthouden van vocht voorkomen. Dit is te merken aan bijvoorbeeld dikke enkels of een benauwd gevoel. De arts probeert dit te voorkomen door de dosis langzaam te verhogen. Krijgt u toch klachten waarschuw dan de arts.

* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden

Gebruik met andere geneesmiddelen:

* Bij gebruik samen met onderstaande middelen kan een te lage bloedsuikerspiegel (hypo) te laat opgemerkt worden. Let daarom extra op de verschijnselen van een hypo:

- bepaalde middelen bij diabetes (suikerziekte)

* Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:

- een kuur om allergie te behandelen (immunotherapie)
- een middel dat als noodmedicatie wordt gebruikt bij een ernstige overgevoeligheids-reactie (adrenaline)

Overleg hierover met de verpleegkundige of arts.

* Bepaalde andere hart-vaatmiddelen (namelijk verapamil en diltiazem) kunnen de werking van dit middel versterken. De arts zal meestal de werking van het hart controleren.

* Overleg met de verpleegkundige of arts bij gebruik met sommige pijnstillers (de zogenaamde ontstekingsremmende pijnstillers). De bloeddrukverlagende werking van dit medicijn kan hierdoor namelijk verminderen. Dit geldt ook voor ontstekingsremmende pijnstillers die zonder recept te koop zijn (zoals naproxen of ibuprofen).

Gebruik bij zwangerschap:

Bij gebruik door volwassenen:

Wilt u zwanger worden of bent u al zwanger? Overleg dan met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Na de bevalling controleert de arts of de baby last heeft van:

- suf zijn
- ademhalingsproblemen
- te weinig glucose in het bloed
- een te langzame hartslag
- een lage bloeddruk.

Gebruik bij borstvoeding:

Bij gebruik door volwassenen:

Geeft u borstvoeding? Gebruik dit middel dan alleen na overleg met de verpleegkundige of arts.

