

Medicatielijst

Deze lijst heeft betrekking op het tredmolenonderzoek en de histamine-provocatietest.

Heeft u binnenkort een tredmolenonderzoek of een histamine-provocatietest? Dan vragen we u te stoppen met het innemen van (bepaalde) medicijnen. Dit doen we omdat uw medicijnen de uitkomst van het onderzoek beïnvloeden.

Als het stoppen van medicijnen problemen voor u oplevert of als u medicatie voor de longen gebruikt die u niet in dit overzicht terugvindt, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie 024 685 9254.

72 uur (3 dagen) voor het onderzoek stoppen met:

Aerius	Tavegil
Allerfre	Telfast
Claritine	Tinest
Mizollen	Xyzal
Promethazine	Zyrtec

48 uur (2 dagen) voor het onderzoek stoppen met:

Anoro	Striverdi
Daxas	Spiolto
Onbrez	Theolair Retard
Relvar Ellipta	Ultibro
Seebri	Unilair
Spiriva	

24 uur (1 dag) voor het onderzoek stoppen met:

AirFluSal Forspiro	Foster
Atimos	Oxis
Duaklir Genuair	Seretide
DuoResp Spiromax	Serevent
Eklira Genuair	Symbicort
Elpenhaler	Singulair
Flutiform	Semprex
Foradil	Tavegyl

12 uur voor het onderzoek stoppen met:

Berodual	Bricanyl
Berotec	Combivent

8 uur voor het onderzoek stoppen met:

Airomir
Atrovent
Ventolin

Het is niet nodig om te stoppen met:

Alvesco	Pulmicort
Flixotide	Qvar