

Clonidine infuus 0,01 mg/ml Rad

Het werkzame middel in dit medicijn is clonidine. In elke ml zit 0,01 mg clonidine(-hydrochloride).

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

- Hoge bloeddruk.
- Pijn.
- Om ontwenningsverschijnselen te voorkomen bij alcohol-verslaving.
- Als slaapmiddel bij kinderen op de intensive-care.

Hoe dit medicijn werkt

Het verwijdt de bloedvaten en verlaagt daardoor de bloeddruk. Ook versterkt het de werking van sommige pijnstillers en kalmeringsmiddelen.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

Wordt toegediend via infuus.

* Stoppen met het gebruik

Bij plotseling stoppen kunnen klachten ontstaan zoals: hartkloppingen, onrust, trillen, misselijk zijn, hoofdpijn en snel stijgen van de bloeddruk. Stop daarom nooit zonder overleg met de arts. Meestal verlaagt de arts de dosering langzaam.

Invloed op reactievermogen en rijvaardigheid:

Dit medicijn vermindert het reactievermogen. Sta daarom voorzichtig op uit bed. Vraag eventueel of een verpleegkundige kan helpen.

* Bij gebruik thuis

Rijd niet tijdens de eerste 3 dagen dat u dit medicijn gebruikt.

Daarna niet rijden als u bijwerkingen heeft die het reactievermogen kunnen verminderen. Pas ook op in andere situaties waarbij u moet opletten. Zoals gereedschap gebruiken of op een ladder staan.

Gebruikt u ook andere medicijnen met invloed op het reactievermogen? Of heeft u vragen? Vraag dan advies aan uw verpleegkundige of arts.

* Alcohol

Pas op met alcohol. Alcohol kan het reactievermogen nog verder verminderen.

Gebruikelijke doseringen:

De arts houdt bij de dosering rekening met bijvoorbeeld leeftijd en gewicht.

Wanneer begint de werking?:

De bloeddruk daalt na 30 tot 60 minuten. Dit is maximaal na 2 tot 4 uur.

Belangrijke informatie

Niet gebruiken bij:

Bepaalde vormen van een te langzame hartslag. Overleg dan met de verpleegkundige of arts.

Bijwerkingen:

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke

bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.
* Vooral aan het begin van de behandeling kunt u suf zijn. Gaat dit niet over? Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

* Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:

- droge mond. Dit kan problemen met het gebit geven. Drink daarom voldoende en verzorg het gebit goed. Dit kan problemen voorkomen.

- duizelig worden bij het overeind komen. Langzamer opstaan kan helpen om duizelig worden te voorkomen.

* Verder kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

- problemen met slapen, moe zijn

- hoofdpijn

- pijn in de mond of wang

- maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, overgeven of verstopping

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

* Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:

- depressie

- erectieproblemen

- zien of horen van dingen die er niet zijn

Waarschuw dan de arts.

* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden

Gebruik met andere geneesmiddelen:

* Als dit middel wordt gebruikt als bloeddruk verlager:

Bij bepaalde middelen bij depressie kan de arts regelmatig de bloeddruk meten en als dat nodig is de dosering van dit middel aanpassen. Niet plotseling stoppen met het gebruik van het middel bij depressie, omdat de bloeddruk dan sterk kan stijgen. Overleg hierover met de arts.

Gebruik bij zwangerschap:

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind.

Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.

Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding:

Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.