

Hydrochloorthiazide drank 0,5 mg/ml Rad

Het werkzame middel in dit medicijn is hydrochloorthiazide. In elke ml drank zit 0,5 mg hydrochloorthiazide.

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

- Bij baby's en jonge kinderen bij:
- Vochtophoping in het lichaam.
 - Hoge bloeddruk.
 - Een nierziekte, namelijk nefrogene diabetes insipidus.

Hoe dit medicijn werkt

Zorgt er voor dat extra vocht wordt uitgeplast. Het verlaagt de bloeddruk.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

Meet de drank af met een spuitje. Kan met het spuitje ook aan sondevoeding worden toegevoegd.

Gebruikelijke doseringen:

* Bij vochtophoping of hoge bloeddruk

Kinderen: 2 tot 6 ml per kilo lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 1 tot 2 keer. Voor een kind van 5 kilo is dit bijvoorbeeld 10 tot 30 ml per dag, verdeeld over 1 tot 2 keer.

* Bij nefrogene diabetes insipidus

Kinderen: 2 tot 4 ml per kilo lichaamsgewicht per dag. Voor een kind van 5 kilo is dit bijvoorbeeld 10 tot 20 ml per dag.

Dosering vergeten?:

Gebruikt uw kind dit medicijn 1 keer per dag? Dan geldt het volgende advies:

- Is het nog dezelfde dag? Neem de dosering dan alsnog in.
- Is het al de volgende dag? Sla dan de vergeten dosering over.

Gebruikt uw kind dit medicijn 2 keer per dag? Dan geldt het volgende advies:

- Is de normale tijd minder dan 1 uur geleden? Neem de vergeten dosering alsnog in.
- Is het langer dan 1 uur geleden? Sla dan de vergeten dosering over.

Wanneer begint de werking?:

De vochtafdrijvende werking begint binnen 1 tot 2 uur. De bloeddruk daalt na 3 tot 4 dagen en is maximaal na ongeveer 4 weken.

Belangrijke informatie

Niet gebruiken bij:

Een vastgestelde afwijking in het hartritme, namelijk het lange QT-syndroom (LQTS). Overleg dan met de verpleegkundige of arts.

Gebruik bij andere ziekten of klachten:

* Let op bij

- vastgestelde nierproblemen. Overleg met de verpleegkundige of arts of u dit middel kunt gebruiken.
- diarree, overgeven of veel zweten (bijvoorbeeld door warm weer of koorts). Door veel vocht verliezen is de kans op sommige

bijwerkingen hoger.

Bijwerkingen:

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij uw kind voor te komen.

Tijdens het gebruik van dit middel kan uw kind duizelig zijn. Dit is vooral bij het overeind komen.

* Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:

- minder zin in eten
- misselijk zijn, overgeven
- huiduitslag, zoals galbulten

Heeft uw kind er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

* Zelden kunnen bepaalde waarden in het bloed veranderen.

Merkt u 2 of meer van de volgende klachten:

- minder zin in eten, misselijk zijn of overgeven
- verstopping
- buikpijn
- slaperig zijn
- in de war zijn
- krampen of slap voelen in de spieren.

Waarschuw dan de arts.

* Dit middel heeft invloed op de hoeveelheid kalium in het bloed en op de nieren. De arts controleert daarom regelmatig het bloed.

* Heeft uw kind last van andere bijwerkingen? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden

Gebruik met andere geneesmiddelen:

* Bij gebruik van dit middel met onderstaande middelen kunnen ernstige afwijkingen in het hartritme optreden. De arts kan daarom het bloed of de werking van het hart controleren of de dosering aanpassen:

- een middel bij hoge bloeddruk (ketanserine)

* Neem dit middel niet in op het zelfde moment als onderstaande middelen. Vraag de apotheek om een inname-schema:

- cholesterolbindende middelen (namelijk colessevelam, colestipol of colestyramine)

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan het bloed controleren en zo nodig de dosering aanpassen:

- een middel bij manische depressie (lithium)

Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan de dosering aanpassen:

- sommige bloeddrukverlagende middelen

Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan het bloed controleren:

- sommige middelen bij epilepsie (namelijk carbamazepine en

oxcarbazepine)

- sommige middelen bij depressie
- een hartmiddel (digoxine)

Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.

Gebruik bij zwangerschap:

Bij gebruik door volwassenen:

Wilt u zwanger worden of bent u al zwanger? Overleg dan met de arts of u dit middel kunt gebruiken. De arts zal uw bloed extra controleren. Ook controleert de arts de groei van de baby.

Gebruik bij borstvoeding:

Bij gebruik door volwassenen:

U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft. Maar gebruik het alleen na overleg met de verpleegkundige of arts.