

Patiënt met borstkanker verwijzen naar klinisch geneticus indien:

Eén van de volgende:

- ▶ borstkanker <40 jaar
- ▶ bilateraal of multifocaal borstkanker, 1e tumor <50 jaar
- ▶ triple-negatief borstkanker <60 jaar
- ▶ man met borstkanker
- ▶ eierstok- of eileiderkanker
- ▶ borstkanker <50 jaar en 1 familielid (**1e graads**) <50 jaar
- ▶ borstkanker en 2 familieleden (**1e of 2e graads**) met borstkanker, 1x <50 jaar
- ▶ borstkanker <50 jaar en 1 familielid (**1e of 2e graads**) prostaatkanker <60 jaar

Gezonde vrouw verwijzen naar klinisch geneticus indien:

verwijs bij voorkeur het aangedane familielid

Eén van de volgende:

- ▶ 1 familielid (**1e graads**) met borstkanker <40 jaar
- ▶ 1 familielid (**1e graads**) met bilateraal of multifocaal borstkanker, waarbij 1e tumor <50 jaar
- ▶ 1 familielid (**1e graads**) met triple-negatief borstkanker <60 jaar
- ▶ 1 man (**1e graads**) met borstkanker
- ▶ 1 familielid (**1e graads**) met eierstok- of eileiderkanker
- ▶ 2 familieleden (**1e of 2e graads**) met borstkanker <50 jaar
- ▶ 3 familieleden (**1e of 2e graads**) met borstkanker, 1x <50 jaar

Geen verwijsindicatie, wel reden voor screening vanaf 40 jaar:

- ▶ 2 familieleden (**1e graads**) met borstkanker <60 jaar
- ▶ 2 familieleden (**1e graads**) met borstkanker, gemiddeld <50 jaar
- ▶ 3 familieleden (**1e of 2e graads**) met borstkanker

▶ **1^e graads familieleden** ouders, kinderen, zussen, broers

▶ **2^e graads familieleden**

grootouders, kleinkinderen, ooms, tantes, kinderen van broers of zussen allen aan dezelfde kant van de familie

legenda