

Chloralhydraat drank 100 mg/ml Rad

Het werkzame middel in dit medicijn is chloralhydraat. In elke ml zit 100 mg chloralhydraat.

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

- Epilepsie.
- Om rustig te zijn bij een onderzoek of behandeling.

Hoe dit medicijn werkt

Dit medicijn werkt op verschillende manieren:

- Het vermindert aanvallen van epilepsie.
- Het werkt rustgevend. Hierdoor verminderen angst en spanning.

Gebruiksaanwijzing



Pas op met het gebruik van alcohol

Dit middel kan het reactievermogen beïnvloeden

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

Voor gebruik omschudden.

Alcohol versterkt de werking en bijwerkingen, gebruik daarom geen alcohol.

Invloed op reactievermogen en rijvaardigheid:

Dit medicijn vermindert het reactievermogen. Rijd daarom niet op de 2 dagen na gebruik van dit medicijn. Pas ook op in andere situaties waarbij u moet opletten. Zoals gereedschap gebruiken of op een ladder staan.

Gebruikt u ook andere medicijnen met invloed op het reactievermogen? Of heeft u vragen? Vraag dan advies aan uw verpleegkundige of arts.

Gebruikelijke doseringen:

Kinderen tot 1 maand: eenmalig 0,5 ml per kilo lichaamsgewicht.

Toedienen via de voedings-sonde.

Kinderen vanaf 1 maand tot 1 jaar: meestal 1 keer 0,5 ml per kilo lichaamsgewicht. Zo nodig na een half uur nog een dosis van 0,25 ml per kilo lichaamsgewicht. Per keer niet meer dan 10 ml.

Kinderen van 1 tot 18 jaar: meestal 1 keer 0,5 ml per kilo lichaamsgewicht. Zo nodig na een half uur nog een dosis van 0,25 tot 0,5 ml per kilo lichaamsgewicht. Per keer niet meer dan 20 ml.

Volwassenen: de dosering wordt in overleg met de arts vastgesteld.

Wanneer begint de werking?:

De werking begint binnen een half uur tot 1 uur.

Belangrijke informatie

Niet gebruiken bij:

Een vastgestelde afwijking in het hartritme, namelijk het lange QT-syndroom (LQTS). Overleg dan met de verpleegkundige of arts.

Gebruik bij andere ziekten of klachten:

* Let op bij

- diabetes (suikerziekte), omdat er suiker in dit middel zit. Vraag de verpleegkundige of arts om advies.
- vastgestelde lever- of nierproblemen. Overleg hierover met de

verpleegkundige of arts.

Bijwerkingen:

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- maagpijn, misselijk zijn
- huiduitslag
- licht gevoel in het hoofd
- nachtmerries
- opwindend, in de war zijn
- onwillekeurige, onhandige bewegingen

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden

Gebruik bij zwangerschap:

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind.

Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.

Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding:

Niet gebruiken als u borstvoeding geeft.