

Algemeen

Nummer kind:
Datum opname:
Speen:
Tepelhoedje: S/M/L

*** Stress-signalen:**

Wenkbrauwen optrekken, fronsen, wegdraaien van speen/tepel, bewegingsonrust

1. Rootingreflex opwekbaar (openen mond en tong laag); voldoende alert / adequate state
2. Baseline SPO2/HF/AF (volgens richtlijn eigen afdeling)
3. Lichaam in voldoende flexie met handen/armen in middellijn
4. Voldoende energie handhaving tonus en flexie lichaam

1.	Ja	/	Nee
2.	Ja	/	Nee
3.	Ja	/	Nee
4.	Ja	/	Nee

4x ja

<4x ja

GEEN ORALE VOEDING MOGELIJK

AANBIEDEN ORALE VOEDING MOGELIJK

5. Vermogen alert blijven tijdens voeding en handhaven lichaamshouding
6. Vermogen ritmisch zuigpatroon te handhaven
7. Vermogen speen aangezogen te houden, geen verlies voeding
8. Vermogen veilig te slikken (zonder hoesten), helder ademgeluid
9. Stresssignalen* afwezig tijdens voedingsmoment
10. Verandering van kleur/teint tijdens voedingsmoment afwezig
11. Saturatie, hartfrequentie en ademfrequentie blijven binnen gestelde grenzen monitor (EFS: HF max 20% onder baseline)
12. Gebruik van hulpademhalingspijpen afwezig

5.	Ja	/	Twijfel	/	Nee
6.	Ja	/	Twijfel	/	Nee
7.	Ja	/	Twijfel	/	Nee
8.	Ja	/	Twijfel	/	Nee
9.	Ja	/	Twijfel	/	Nee
10.	Ja	/	Twijfel	/	Nee
11.	Ja	/	Twijfel	/	Nee
12.	Ja	/	Twijfel	/	Nee

Bij 1x Twijfel en Nee orale voeding aanpassen / afbreken!

bij 8x ja

bij < 8 x ja

Bij volgend voedingsmoment orale voeding in overweging nemen

Aanpassingen bij aanbieden volgende orale voeding:

- Aanpassing 1 (uitval item 5): Houding kind corrigeren
- Aanpassing 2 (uitval item 6): Zuigreeksen en adempauzes reguleren
- Aanpassing 3 bij fles (uitval items 7 en 8): Aanpassen speen (naar low flow speen)
- Aanpassing 4 bij borst (uitval items 7 en 8): Gebruik tepelhoedje **S / M / L**

Bij uitval items 9, 10, 11 en 12 alle drie aanpassingen in overweging nemen

Indien aanpassing(en) binnen 48 uur onvoldoende effect: Logopedie in consult vragen