

## (Post)IC-schaal Logopedie – Tracheacanulepatiënten

Naam: ..... Type canule: ..... Datum: .....

	1	2	3	4	5	6
<b>Fysieke conditie</b>	Ligt de hele dag op bed en slaapt erg veel; moeilijk aanspreekbaar	Ligt de hele dag op bed, maar is vaak wakker; goed aanspreekbaar	Komt 1x per dag een half uur in de stoel	Komt 1x per dag een uur of langer in de stoel	Komt 2x (3x) per dag een uur of langer in de stoel	Zit een groot deel van de dag in de stoel
<b>Zelfstandige ademing</b>	Volledige beademing	Volledige beademing, af en toe los	Overdag enkele uren zelfstandige ademing; rest van de dag beademing	Overdag zelfstandige ademing, 's nachts beademing	Grotendeels zelfstandige ademing; enkele uren per dag aan de beademing	Volledig zelfstandige ademing met of zonder extra O2
<b>Opfoesten</b>	Hoest alleen bij diepe prikkel; alles uitzuigen	Hoestkracht is zeer zwak; wordt meermaals per dienst diep uitgezogen	Hoestkracht is matig; wordt meermaals per dienst zowel diep als oppervlakkig uitgezogen	Hoeskracht is redelijk; wordt meermaals per dienst oppervlakkig uitgezogen	Hoest op, wordt 1 à 2x per dienst oppervlakkig uitgezogen	Hoest bijna alles zelf op, tot in de canule of tot in de farynx/mond.
<b>Cuff status</b>	Kan alleen rustig ademen met opgeblazen cuff	Kan tot een half uur achtereen rustig ademen met een lege cuff; spreekventiel of afgedopt	Kan een half uur tot een uur achtereen rustig ademen met lege cuff; spreekventiel of afgedopt	Kan enkele uren achtereen rustig ademen met een lege cuff; spreekventiel of afgedopt	Kan hele dag ademen met lege cuff; spreekventiel of afgedopt. Nacht: cuff opgeblazen met trachvent.	Kan moeiteloos dag en nacht rustig ademen met een lege cuff; spreekventiel of afgedopt
<b>Voeding</b>	Volledig niet-oraal: NM-sonde, PEG-sonde/ parenteraal	Volledig niet-oraal, wel soms iets om te oefenen of voor de smaak	SV met orale aanvulling of oraal met SV als aanvulling	Volledig oraal met veel aanpassingen	Volledig oraal met enkele aanpassingen	Volledig oraal, zonder aanpassingen
<b>Slikken</b>	Afagie (chronische aspiratie) of slikken nog niet aan de orde	Ernstige dysfagie (chronische aspiratie) of slikt nauwelijks	Matige dysfagie (aspireert makkelijk) of slikt te weinig	Lichte dysfagie (soms aspiratie), slikken kost moeite; aanpassingen	Minimale dysfagie: twijfel, goed slikken kost soms moeite	Normaal slikken
<b>Stem</b>	Afonie of niet te beoordelen (bijv. door opgeblazen cuff)	Zeer zwakke stemgeving met afone momenten	Zwakke stemgeving of matige stemkwaliteit	Lichte stoornis in de stemkwaliteit en/of luidheid	Minimale stoornis in de stemkwaliteit en/of luidheid	Normale stemkwaliteit
<b>Spraakverstaanbaarheid</b>	Spreken is niet mogelijk of niet te beoordelen	Spraak is nauwelijks verstaanbaar	Moeilijk te verstaan	Voldoende verstaanbaar	Meestal goed te verstaan	Normale verstaanbaarheid voor iedereen
<b>Instrueerbaarheid en leerbaarheid</b>	Niet instrueerbaar, niet in staat om adviezen toe te passen	Kortdurend instrueerbaar; niet in staat om adviezen toe te passen	Kortdurend instrueerbaar; sturing nodig bij het toepassen van adviezen.	Instrueerbaar tijdens geheel consult; enige sturing nodig bij het toepassen van adviezen.	Instrueerbaar, alleen cues nodig om adviezen zelfstandig toe te passen.	Instrueerbaar en kan adviezen volledig zelfstandig toepassen.