

Medicatielijst

Deze lijst heeft betrekking op de histamineprovocatietest.

72 uur (3 dagen) voor het onderzoek stoppen met: (anti-allergie medicatie)

Cetirizine di-hydrochloride (Zyrtec, Prevalin, Reactine)
Clemastine (Tavegyl)
Desloratadine (Aerius, Neoclarityn)
Fexofenadine hydrochloride (Telfast, Allegra)
Levocetirizine (Xyzal)
Loratadine (Allerfre/ Claritine)
Mizolastine (Mizollen)
Promathazine
Chloorcyclizine/cinnarizine (primatour)
Rupatadine (Rupafin)
Acrivastine (semprex) **24 uur stoppen.**

48 uur (2 dagen) voor het onderzoek stoppen met:

Roflumilast (Daxas)
Umeclidinium (Incruse Ellipta)
Indacaterol (Onbrez, Hirobriz)
Theofylline (Theolair Retard)
Glycopyrronium (Seebri, Tovanor)
Tiotropium (Spiriva, Tiotrus)
Olodaterol (Striverdi)
Indacaterol/Glycopyrronium (Ultibro, Xoterna)
Fluticasonefuroaat/vilanterol (Relvar Ellipta)
Umeclidinium/vilanterol (Anoro)
Tiotropium/Olodaterol (Spiolto)
Indacaterol/mometason (Aetectura)
Glycopyrronium/Formoterol (Bevespi)
Indacaterol/glycopyrronium/mometason (Enerzair)
Beclometason/formoterol/glycopyrronium (Trimbow)
Fluticasone/umeclidinium/vilanterol (Trelegy Ellipta)
Formoterol/glycopyrronium/budesonide (Trixeo)

24 uur (1 dag) voor het onderzoek stoppen met:

Salmeterol (Serevent)
Formoterol (Foradil, Atimos,Oxis)
Aclidinium (Elklira Genuair, Bretaris Genuair)
Montelukast (Singulair)
Formoterol+Beclometason (Foster)
Aclidinium+Formoterol (Duaklir Genuair)
Salmeterol+Fluticasone (Seretide, Elpenhaler, AirFluSal
Fospilo, Salflutin, Salfuler)
Formoterol+Budesonide (DuoResp, Symbicort, Bufoler)
Formeterol+Fluticasone (Flutiform)

Formoterol+Budesonide (Symbicort)

12 uur voor het onderzoek stoppen met:

Terbutaline (Bricanyl)

Fenoterol+Ipratropium (Berodual)

Salbutamol+Ipratropium (Combivent, Ipramol)

8 uur voor het onderzoek stoppen met:

Salbutamol (Airomir, Ventolin, Salamol)

Ipratropium (Atrovent, Ipraxa)

Het is niet nodig te stoppen met:

Ciclesonide (Alvesco)

Beclomethason (Qvar)

Budesonide (Pulmicort)

Fluticasone (Flixotide)