

Midazolam infuus 5 mg/ml Rad

Het werkzame middel in dit medicijn is midazolam. In elke ml zit 5 mg midazolam.

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

- Als slaapmiddel bij operaties.
- Om rustig te zijn tijdens een behandeling, een onderzoek of bij opname op de intensive care afdeling.
- Angst, spanning en onrust.
- Benauwd zijn.
- Tijdens een epilepsie aanval.

Hoe dit medicijn werkt

Het vermindert angst en spanning. Werkt rustgevend. Het ontspant de spieren en bevordert de slaap.
Het stopt de epilepsie aanval.

Gebruiksaanwijzing



Pas op met het gebruik van alcohol
Dit middel kan het reactievermogen beïnvloeden

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

Wordt toegediend in een bloedvat.

* Medicijn mee op reis

Dit middel valt onder de Opiumwet. Daarom is bij reizen naar het buitenland voor de douane een verklaring nodig. Hierin staat dat dit middel als medicijn wordt gebruikt. Overleg daarom ten minste 2 maanden voor de reis met de verpleegkundige of arts. Zij kunnen kijken welke papieren nodig zijn. Of kijk op www.hetcak.nl en klik op 'Medicijnen mee op reis verklaring' voor meer informatie.

Invloed op reactievermogen en rijvaardigheid:

Dit medicijn vermindert het reactievermogen. Sta daarom voorzichtig op uit bed. Vraag eventueel of een verpleegkundige kan helpen.

Rijd niet binnen 24 uur nadat dit medicijn is toegediend. Pas ook op in andere situaties waarbij u moet opletten. Zoals gereedschap gebruiken of op een ladder staan.

* Alcohol

Pas op met alcohol. Alcohol kan het reactievermogen nog verder verminderen.

Gebruikelijke doseringen:

De arts houdt bij de dosering rekening met bijvoorbeeld leeftijd en gewicht.

Wanneer begint de werking?:

De werking begint binnen 1 tot 5 minuten.

Belangrijke informatie

Gebruik bij andere ziekten of klachten:

* Let op bij

- sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming.
Bijvoorbeeld Myasthenia gravis. In een rustige fase van de ziekte is

gebruik geen probleem.

- een aandoening met korte periodes van ademstilstand tijdens de slaap (slaap-apneu).

- astma of COPD (chronische longziekte)

Overleg met de verpleegkundige of arts als de klachten erger worden.

* Let ook op bij

- vastgestelde nierproblemen. De arts past soms de dosering aan.

- vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de verpleegkundige of arts of u dit middel kunt gebruiken.

Bijwerkingen:

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

* Tijdelijk verlies van het geheugen treedt op. Dit begint binnen enkele minuten na toediening en houdt enkele uren aan.

* Op de prik plek kan zwelling of een rode huid ontstaan. Dit kan wijzen op een ontsteking van het bloedvat. Waarschuw dan de arts.

* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- slaperig en suf zijn

- moe zijn

- zwak gevoel in de spieren

- onwillekeurige, onhandige bewegingen

- duizelig zijn, hoofdpijn

- afvlakken van het gevoel

- dubbel zien.

Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf weer.

* Vooral bij ouderen en kinderen:

- zien of horen van dingen die er niet zijn

- psychose (heel erg in de war zijn, vaak met horen en zien van dingen die er niet zijn)

- nachtmerries

- opgewonden zijn, onrustig zijn

- prikkelbaar zijn, agressief zijn, woede-uitbarstingen.

Waarschuw dan de arts.

* De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

- depressie

- seksuele problemen, zoals meer of minder zin in vrijen.

Overleg dan met de arts.

* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden

Gebruik met andere geneesmiddelen:

* Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen:

- bepaalde antibiotica (claritromycine, erytromycine en telitromycine)

- sommige middelen tegen schimmelinfecties (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol en voriconazol). Dit geldt NIET voor middelen die op de huid worden gebruikt.

- een medicijn bij kanker (namelijk idelalisib)

Overleg hierover met de verpleegkundige of arts.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden

gebruikt, maar de arts kan de dosering aanpassen:

- bepaalde hart-vaatmiddelen (diltiazem en verapamil)
- sommige medicijnen bij tuberculose
- sommige medicijnen tegen epilepsie
- een medicijn bij schimmelinfecties (griseofulvine)
- kruidenmiddelen met Sint Janskruid (Hypericum)
- sommige middelen bij kanker (dabrafenib en enzalutamide)
- bepaalde middelen bij kanker (crizotinib en imatinib)

Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.

Gebruik bij zwangerschap:

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind.

Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.

Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding:

Geeft u borstvoeding? Gebruik dit middel dan alleen na overleg met de verpleegkundige of arts. Waarschuw de arts als de baby slaperig of suf is en slecht drinkt.