

Furosemide infuus 5 mg/ml Rad

Het werkzame middel in dit medicijn is furosemide. In elke ml zit 5 mg furosemide.

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

Vochtophoping in het lichaam, bijvoorbeeld bij:

- hartfalen (minder goed pompen van het hart)
- leverziekte (levercirrose)
- longoedeem
- nierziekte.

Wordt ook gebruikt bij:

- Hoge bloeddruk.
- Te veel calcium in het bloed.

Hoe dit medicijn werkt

Zorgt er voor dat extra vocht wordt uitgeplast. Het verlaagt de bloeddruk.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

Wordt via een infuus toegediend in een bloedvat.

Gebruikelijke doseringen:

De arts houdt bij de dosering rekening met bijvoorbeeld gewicht en de werking van de lever en nieren.

Wanneer begint de werking?:

De vochtafdrijvende werking begint binnen enkele minuten.

Belangrijke informatie

Niet gebruiken bij:

Een vastgestelde afwijking in het hartritme, namelijk het lange QT-syndroom (LQTS). Overleg dan met de verpleegkundige of arts.

Gebruik bij andere ziekten of klachten:

* Let op bij

- (aanleg voor) jicht
- vergroting van de prostaat
- moeilijk kunnen plassen door nierstenen
- een ziekte met droge ogen, mond en slijmvliezen (syndroom van Sjögren)

Overleg met de verpleegkundige of arts als de klachten erger worden.

* Let ook op bij

- vastgestelde nierproblemen. De arts past soms de dosering aan.
- diarree, overgeven of veel zweten (bijvoorbeeld door warm weer of koorts). Door veel vocht verliezen is de kans op sommige bijwerkingen hoger.

Overleg hierover met de verpleegkundige of arts.

Bijwerkingen:

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- duizelig voelen bij het overeind komen. Langzamer opstaan kan helpen om duizelig worden te voorkomen.
- droge mond. Dit kan problemen met het gebit geven. Verzorg

het gebit goed. Dit kan problemen voorkomen.

* Ook kan door het gebruik van dit medicijn hoofdpijn ontstaan. Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

* Zelden kunnen bepaalde waarden in het bloed veranderen.

Merkt u een of meer van de volgende klachten:

- minder zin in eten, misselijk zijn of overgeven
- slaperig zijn
- in de war zijn
- slap voelen in de spieren of spierkrampen
- geheugenverlies
- horen of zien van dingen die er niet zijn
- depressie.

Waarschuw dan de arts.

* Ook kunnen zelden voorkomen:

- plotselinge blauwe plekken, rode puntjes op de huid
- onverwachte bloedneuzen
- wondjes die moeilijk stoppen met bloeden.

Waarschuw dan de arts.

* Dit middel heeft invloed op de hoeveelheid kalium in het bloed en op de nieren. De arts controleert daarom regelmatig het bloed.

* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden

Gebruik met andere geneesmiddelen:

* Bij gebruik van dit middel met onderstaande middelen kunnen ernstige afwijkingen in het hartritme optreden. De arts kan daarom het bloed of de werking van het hart controleren of de dosering aanpassen:

- een middel bij hoge bloeddruk (ketanserine)

* Bij gebruik van dit middel samen met onderstaande middelen, kan meer vocht worden vastgehouden. Overleg hierover met de arts:

- ontstekingsremmende pijnstillers. Dit geldt ook voor ontstekingsremmende pijnstillers die zonder recept te koop zijn.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan het bloed controleren en zo nodig de dosering aanpassen:

- een middel bij manische depressie (lithium)

Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan de dosering aanpassen:

- sommige bloeddrukverlagende middelen

Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan het bloed controleren:

- sommige middelen bij epilepsie (namelijk carbamazepine en oxcarbazepine)
- een hartmiddel (digoxine)

Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.

Gebruik bij zwangerschap:

Wilt u zwanger worden of bent u al zwanger? Overleg dan met de arts of u dit middel kunt gebruiken. De arts zal uw bloed extra controleren. Ook controleert de arts de groei van de baby.

Gebruik bij borstvoeding:

U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft. Maar gebruik het alleen na overleg met de verpleegkundige of arts.