

Prednisolon drank 5 mg/ml Rad

Het werkzame middel in dit medicijn is prednisolon. In elke ml drank zit 5 mg prednisolon.

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

Dit middel wordt vaak gebruikt bij klachten of aandoeningen waarbij de eigen afweer te sterk reageert. Zoals:

- reuma en gewrichts- en pees-ontstekingen
- long-, huid- en darmziekten
- oogontstekingen
- na een transplantatie

Dit medicijn wordt ook gebruikt bij:

- kanker.
- als de bijnier-schors zelf niet genoeg hormoon aanmaakt.
- bij verlamming van zenuwen in het gezicht.

Hoe dit medicijn werkt

Dit medicijn lijkt op de hormonen die het lichaam zelf maakt in de bijnier-schors. Deze hormonen heten corticosteroid-hormonen. Het remt ontstekingen en vermindert een allergische reactie. Het heeft ook veel andere effecten. Zo werkt het bij kanker tegen pijn, misselijk zijn en overgeven. Ook remt het afstoting van het nieuwe orgaan na een transplantatie.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

Meet de voorgeschreven dosering af. Vlak voor of met wat eten innemen kan helpen tegen maagklachten.

De arts adviseert wanneer u dit medicijn moet innemen.

Bijvoorbeeld:

- in 1 keer 's ochtends, bij het ontbijt
- verdeeld over enkele keren per dag
- om de dag (altijd op even of oneven datum).

De arts kan ook anders adviseren. Is het niet duidelijk? Vraag dan om advies.

De arts kan dit middel als stootkuur voorschrijven. Dit is een korte kuur van ongeveer een week, met een hoge dosering.

Dit medicijn kan ook langere tijd gebruikt worden. Gebruikt u dit middel langer dan 3 weken? Stop dan nooit opeens met dit medicijn.

- U kunt dan klachten krijgen, zoals koorts, spierpijn, pijn in de gewrichten en ziek voelen.

- Ook kan een tekort aan corticosteroïd hormoon ontstaan. Het lichaam heeft namelijk tijd nodig om zelf weer (genoeg) van dit hormoon te maken. Een tekort is te merken aan hoofdpijn, misselijk voelen, duizelig zijn, geen zin in eten, stemmingswisselingen en soms koorts.

Bij stoppen kan de verpleegkundige of arts adviseren over het verminderen van de dosering.

Gebruikelijke doseringen:

De dosering hangt af van waar u dit medicijn voor krijgt en hoe lang u het moet gebruiken. En bijvoorbeeld ook van uw leeftijd en gewicht.

Dosering vergeten?:

Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag? Dan geldt het volgende advies:

- Is het nog dezelfde dag? Neem de dosering dan alsnog in.
- Is het al de volgende dag? Sla dan de vergeten dosering over.

Gebruikt u dit medicijn 2 of meer keer per dag? Dan geldt het volgende advies:

- Duurt het langer dan 4 uur voor u de volgende moet innemen? Neem de vergeten dosering alsnog in.
- Duurt het minder dan 4 uur voor de volgende? Sla dan de vergeten dosering over.

Gebruikt u dit medicijn 1 keer per 2 dagen? Dan geldt het volgende advies:

- Is het nog dezelfde avond? Neem de dosering dan alsnog in.
- Is het al de volgende dag? Sla dan de vergeten dosering over.

Wanneer begint de werking?:

De werking begint binnen enkele uren. De effecten zijn binnen enkele dagen te merken.

Belangrijke informatie

Gebruik bij andere ziekten of klachten:

* Let op bij

- een zweer in de maag of darm of erge maagpijn of zuurbranden
- depressie
- manische depressie (depressie afgewisseld met overdreven opgewekt gedrag)
- hoge bloeddruk. De bloeddruk kan nog verder stijgen. De arts kan dit controleren.
- vastgesteld hartfalen (minder goed pompen van het hart). De klachten kunnen erger worden doordat u meer vocht vasthoudt. Dit is te merken aan bijvoorbeeld dikkere enkels, vaker benauwd zijn of snel zwaarder worden.

- sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming (bijvoorbeeld Myasthenia gravis)
Overleg met de verpleegkundige of arts als de klachten erger worden.

* Let ook op bij

- infecties door bijvoorbeeld bacteriën of virussen. Overleg hierover met de arts.
- diabetes (suikerziekte). De hoeveelheid glucose (= suiker) in het bloed kan hoger zijn dan normaal. Overleg met de arts of de diabetes-verpleegkundige.
- verhoogde oogdruk (glaucoom). De druk kan door het gebruik van dit middel stijgen. Meld bij een volgend bezoek aan de oogarts dat u dit middel gebruikt.
- als u besmet bent met tuberculose of tuberculose heeft. Dit medicijn kan namelijk de tuberculose verergeren. Maar soms geeft de arts het juist bij tuberculose. Overleg daarom met de verpleegkundige of arts of u dit medicijn kunt gebruiken.

Bijwerkingen:

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- irritatie van de maag. Vlak voor of met wat eten innemen kan helpen tegen maagklachten.

-
- andere maag-darmklachten zoals overgeven, diarree, misselijk zijn
 - meer of minder zin in eten
 - zwaarder worden door vasthouden van vocht
 - duizelig zijn of zwak gevoel in de spieren. Hierdoor is de kans op vallen groter.
 - hoofdpijn
 - slecht slapen
 - onrust, angstig zijn.

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

* Ook kan de hoeveelheid suiker in het bloed stijgen. Soms kan de arts daarom de bloedsuiker-waarde controleren. Merkt u een of meer van de volgende klachten:

- veel plassen
- dorst, droge mond
- zoete geur uit de mond
- problemen met zien en snel en diep ademen.

Waarschuw dan de arts.

* Verder kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

- depressie
- epilepsie aanval
- heel erg in de war zijn
- erge stemmings-stoornissen (manie)
- tintelingen, geen gevoel of een branderig gevoel in de armen, benen of gewrichten.

Waarschuw dan de arts.

* De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

- overgevoeligheids-reacties. Te merken aan huiduitslag, galbulten, jeuk of een plotselinge zwelling van tong, lippen, gezicht of keel
- een bloedprop in een bloedvat (trombose). Te merken aan zwelling van één been. Soms met pijn, een zwaar gevoel, rode of blauwe kleur van het been. Een benauwd gevoel, snel en oppervlakkig ademen. Drukkende pijn op de borst. Dit kan uitstralen naar de kaak, armen, rug of maag. Meestal met misselijk zijn en zweten. Scheve mond, verward of onduidelijk spreken, verlamming of krachtverlies in een arm of been. Erge hoofdpijn, problemen met zien.

- veel pijn in de bovenbuik met misselijk zijn en een opgeblazen gevoel

- veel vocht vasthouden. Dit is te merken aan bijvoorbeeld dikkere enkels, benauwd gevoel of snel zwaarder worden. Dit kan erop wijzen dat het hart minder goed kan pompen (hartfalen).

Waarschuw dan meteen de arts.

* Na lang gebruik of meerdere korte kuren

De volgende bijwerkingen komen vooral voor na gebruik langer dan enkele weken. Ook kunnen deze bijwerkingen ontstaan bij gebruik van meerdere korte kuren in een jaar (bijvoorbeeld meer dan 4):

- oogproblemen. Bijvoorbeeld vertroebeling van de ooglens (staar) en verhoging van de oogdruk. De arts doet hier extra controles voor.
- menstruatie problemen of wegblijven van de menstruatie
- verschillende huidproblemen, bijvoorbeeld striemen, kleine bloedingen, puistjes, minder snel genezen van wondjes, huiduitslag

-
- andere verdeling van vet over het lichaam (dikker gezicht, buik en nek en minder vet op de armen en benen)
 - een grotere kans op infecties. Ook kan het lichaam sterker reageren op infecties.
- Overleg dan met de arts.
- * Bij gebruik langer dan 3 maanden of meerdere kuren in een jaar kan botontkalking ontstaan. De arts kan soms medicijnen voorschrijven om botontkalking te voorkomen. Bespreek of deze medicijnen misschien bij u nodig zijn.
 - * Bij kinderen kan bij een gebruik langer dan enkele weken de groei worden geremd. Dit middel wordt daarom vaak gestopt vlak voor de groeispurt in de puberteit. Vóór de puberteit is de kans op groeiremming kleiner bij gebruik 1 keer per 2 dagen en bij inname 's ochtends.
 - * Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden

Gebruik met andere geneesmiddelen:

- * Bij gebruik samen met bloedverdünnende middelen (namelijk acenocoumarol, fenprocoumon of warfarine) bestaat een grotere kans op bloedingen. Overleg daarom met de apotheek over het inlichten van de trombosedienst of arts hierover. Neem zelf contact op met de trombosedienst of arts bij stoppen met het gebruik.
- * Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan de dosering aanpassen en zo nodig het bloed controleren:
 - een middel dat de afweer onderdrukt (ciclosporine)Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.
- * Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan de dosering aanpassen:
 - sommige medicijnen bij tuberculose
 - sommige medicijnen tegen epilepsie
 - een medicijn bij schimmelinfecties (griseofulvine)
 - kruidenmiddelen met Sint Janskruid (Hypericum)
 - sommige middelen bij kanker (dabrafenib en enzalutamide)Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.
- * Bij gebruik van dit middel samen met onderstaande middelen is er meer kans op een bloeding of zweer in de maag. De arts kan een middel voorschrijven dat de maag beschermt:
 - sommige bloedverdunners (namelijk acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium)
 - ontstekingsremmende pijnstillers. Dit geldt ook voor ontstekingsremmende pijnstillers die zonder recept te koop zijn
- * Niet samen gebruiken met bepaalde inentingën. Namelijk vaccins met levende of verzwakte bacteriën of virussen. Hierdoor kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan. Overleg hierover met de arts.
- * Door dit middel werken sommige inentingën minder goed. Namelijk vaccins met dode bacteriën of niet actieve virus-deeltjes. Daardoor kan de bescherming onvoldoende of korter zijn. Overleg hierover met de arts.

Gebruik bij zwangerschap:

Wilt u zwanger worden of bent u al zwanger? Overleg dan met de arts of u dit middel kunt gebruiken. Na overleg is een korte kuur meestal wel mogelijk.

Langer gebruik van hoge doseringen kan gevolgen hebben voor de groei van het kind. Ook kan het de werking van de bijniere van de baby beïnvloeden.

Gebruik bij borstvoeding:

U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft. Gebruikt u dit middel langer dan enkele weken? Het kan dan nodig zijn de groei van de baby extra te controleren. Overleg hierover met de arts.