

## Geneesmiddelen

### Gegevens patiënt

Naam: \_\_\_\_\_ Pin.nr. (intern): \_\_\_\_\_  
 Geb.datum: \_\_\_\_\_ BSN (extern): \_\_\_\_\_  
 Adres: \_\_\_\_\_ Geslacht: M / V  
 Postcode/Plaats: \_\_\_\_\_

### Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (arts): \_\_\_\_\_ Afdeling: \_\_\_\_\_  
 Naam ziekenhuis: \_\_\_\_\_ Telefoonnr/sein: \_\_\_\_\_  
 Adres: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
 Postcode/Plaats: \_\_\_\_\_ Projectnr.: \_\_\_\_\_

### Toelichting bij de aanvraag / co-medicatie

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### DIT BLOK ALTIJD INVULLEN

#### Afnamegegevens

Afnamedatum: \_\_\_\_\_  
 Afnametijd: \_\_\_\_\_  
 Gewicht patient: \_\_\_\_\_ kg

#### Reden van aanvraag

- Controle, klinisch goed ingesteld
- Vermoeden van therapie-ontrouw
- Vermoeden van subtherapie
- Vermoeden van overdosering
- Vermoeden van intoxicatie
- Vermoeden van interactie met \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

CITO alleen i.o.m. apotheker via (024) 361 41 63

**Codes afnamematerialen z.o.z.**

### Gegevens te bepalen geneesmiddel(en)

Preparaat	Dosering	i.v./oraal	Sinds	Tijdstip en datum laatste toediening
_____	_____ d.d. _____ mg	_____	_____	_____ : _____ op _____ / _____ / 20 _____
_____	_____ d.d. _____ mg	_____	_____	_____ : _____ op _____ / _____ / 20 _____

#### Antibiotica

p4/k4

- Amikacine dal p4
- Amikacine top p4
- Ceftazidim k4
- Ciprofloxacine k4
- Co-trimoxazol (sulfamethoxazol/trimethoprim) k4
- Doxycycline k4
- Flucloxacilline k4
- Vrije concentratie Flucloxacilline k4
- Gentamicine dal p4
- Gentamicine top p4
- Piperacilline k4
- Tobramycine dal p4
- Tobramycine top p4
- Trimethoprim k4
- Vancomycine dal p4
- Vancomycine top p4
- Vancomycine continu p4
- \_\_\_\_\_

#### Tijdstippen bloedafname en start infuus altijd vermelden!

- Dosering: \_\_\_\_\_ mg
- Interval: \_\_\_\_\_ uur
- Tijdstip start infuus: \_\_\_\_\_ uur
- Bloedafname: dal: \_\_\_\_\_ uur
- top: \_\_\_\_\_ uur
- anders: \_\_\_\_\_ uur

#### Antivirale middelen

k4/p4

- Aciclovir p4
- Ganciclovir p4
- Ribavirine k4
- \_\_\_\_\_

#### Oncolytica

k4

- Abiraterone (aanleveren op ijs)\*
- Cabozantinib
- Cobimetinib
- Enzalutamide
- Etoposide k4/p4
- Imatinib
- Lenvatinib
- Methotrexaat T = \_\_\_\_\_ uur (p4) altijd aanmelden!

- Niraparib
- Olaparib
- Pazopanib
- Regorafenib
- Sorafenib
- Sunitinib + desethylsunitinib
- Vemurafenib
- \_\_\_\_\_

#### Anti-epileptica

p4

- Carbamazepine
- Fenobarbital
- Fenytoïne
- Valproïnezuur
- Vrije concentratie valproïnezuur
- \_\_\_\_\_

#### Antiretrovirale middelen

k4

- Abacavir
- Atazanavir
- Bictegravir
- Darunavir
- Dolutegravir (aanleveren op ijs)\*
- Doravirine
- Efavirenz
- Elvitegravir
- Emtricitabine
- Etravirine
- Lamivudine
- Lopinavir
- Nevirapine
- Raltegravir
- Rilpivirine
- Saquinavir
- Tenofovir (TDF)
- Tenofovir (TAF)
- Zidovudine
- \_\_\_\_\_

#### Antimycotica

p4

- Anidulafungine (aanleveren op ijs)\*
- Caspofungine (aanleveren op ijs)\*
- Flucanazol
- Flucytosine dal
- Flucytosine top
- Isavuconazol
- Itraconazol
- Micafungine
- Posaconazol
- Teicoplanine
- Voriconazol
- \_\_\_\_\_

#### Immunosuppressiva

k4

- Mycophenolzuur
- \_\_\_\_\_

#### Diversen

p4/g4 [\$]

- Coffeïne
- Digoxine
- Lithium gs4
- Theofylline
- Thiopental/Pentobarbital
- \_\_\_\_\_

#### Tuberculose-middelen

p4 [#]

#### Afnemen of op 2 uur of op 2, 4 en 6 uur na toedienen (farmacokinetische curve, z.o.z.)

- Azitromycine
- Bedaquiline
- Claritromycine
- Clofazamine
- Ethambutol
- Isoniazide
- Levofloxacine
- Linezolid
- Moxifloxacine
- Pyrazinamide
- Rifampicine
- \_\_\_\_\_

**[ # ] Opmerking: op droogijs aanleveren**  
**[ \$ ] overleg met apotheker over transport condities**

