

Midazolam drank 2 mg/ml Rad

Het werkzame middel in dit medicijn is midazolam. In elke ml drank zit 2 mg midazolam.

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

Als slaapmiddel bij operaties.

Hoe dit medicijn werkt

Het vermindert angst en spanning. Werkt rustgevend. Het ontspant de spieren en bevordert de slaap.

Gebruiksaanwijzing



Pas op met het gebruik van alcohol

Dit middel kan het reactievermogen beïnvloeden

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

Meteen voor het slapen innemen.

Neem geen grapefruit(sap) zolang u dit middel gebruikt. Bij gebruik van grapefruit(sap) is de kans op bijwerkingen groter.

* Hoe lang gebruiken

Gebruik het niet langer dan 2 weken achter elkaar, zonder overleg met de arts. Daarna werkt het minder goed.

* Stoppen met het gebruik

Als u weer stopt met dit middel kunnen de klachten tijdelijk heviger terug komen.

Na lang gebruik kunnen bij plotseling stoppen klachten ontstaan zoals:

- angst, rusteloos of prikkelbaar zijn.
- hoofdpijn
- spierpijn
- slaapproblemen

Om deze klachten dan zo veel mogelijk te voorkomen moet het gebruik langzaam worden verminderd. Overleg hierover met de arts.

* Medicijn mee op reis

Voor dit middel is bij reizen naar het buitenland een speciale verklaring nodig. Hierin staat dat dit middel als medicijn wordt gebruikt. Overleg daarom ten minste 2 maanden voor de reis met de verpleegkundige of arts. Zij kunnen kijken welke papieren nodig zijn. Of kijk op www.hetcak.nl en klik op 'Medicijnen mee op reis verklaring' voor meer informatie.

Invloed op reactievermogen en rijvaardigheid:

Dit medicijn vermindert het reactievermogen. Rijd daarom niet binnen 8 uur na het innemen van dit medicijn. Daarna niet rijden als u bijwerkingen heeft die het reactievermogen kunnen verminderen. Pas ook op in andere situaties waarbij u moet opletten. Zoals gereedschap gebruiken of op een ladder staan. Gebruikt u ook andere medicijnen met invloed op het reactievermogen? Of heeft u vragen? Vraag dan advies aan uw verpleegkundige of arts.

* Alcohol

Pas op met alcohol. Alcohol kan het reactievermogen nog verder verminderen.

	Gebruikelijke doseringen: Kinderen: De arts houdt bij de dosering rekening met het lichaamsgewicht. Wanneer begint de werking?: De werking begint binnen een half tot anderhalf uur.
Belangrijke informatie	Gebruik bij andere ziekten of klachten: * Let op bij - sommige spierziekten met erge spierzwakte of verlamming. Bijvoorbeeld Myasthenia gravis. In een rustige fase van de ziekte is gebruik geen probleem. - een aandoening met korte periodes van ademstilstand tijdens de slaap (slaap-apneu). - astma of COPD (chronische longziekte) Overleg met de verpleegkundige of arts als de klachten erger worden. * Let ook op bij - vastgestelde nierproblemen. De arts past soms de dosering aan. - vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de verpleegkundige of arts of u dit middel kunt gebruiken. Bijwerkingen: Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen. * De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: - moe zijn, zwak gevoel in de spieren - onwillekeurige, onhandige bewegingen - duizelig zijn, hoofdpijn - afvlakken van het gevoel - dubbel zien. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf weer. * De volgende bijwerkingen komen zelden voor: - depressie - zien of horen van dingen die er niet zijn - psychose (heel erg in de war zijn, vaak met horen en zien van dingen die er niet zijn) - nachtmerries - opgewonden zijn, onrustig zijn - prikkelbaar zijn, agressief zijn, woede-uitbarstingen. Waarschuw dan de arts. * Ook kunnen zelden seksuele problemen ontstaan, zoals meer of minder zin in vrijen. Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts. * Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.
Gebruik in bijzondere omstandigheden	Gebruik met andere geneesmiddelen: * Gebruik dit middel niet samen met onderstaande middelen: - bepaalde antibiotica (claritromycine, erytromycine en telitromycine) - sommige middelen tegen schimmelinfecties (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol en voriconazol). Dit geldt NIET voor middelen die op de huid worden gebruikt. - een medicijn bij kanker (namelijk idelalisib)

Overleg hierover met de verpleegkundige of arts.

* Dit middel kan samen met onderstaande medicijnen worden gebruikt, maar de arts kan de dosering aanpassen:

- bepaalde hart-vaatmiddelen (diltiazem en verapamil)
- sommige medicijnen bij tuberculose
- sommige medicijnen tegen epilepsie
- een medicijn bij schimmelinfecties (griseofulvine)
- kruidenmiddelen met Sint Janskruid (Hypericum)
- sommige middelen bij kanker (dabrafenib en enzalutamide)
- bepaalde middelen bij kanker (crizotinib en imatinib)

Overleg zo nodig met de verpleegkundige of arts.

Gebruik bij zwangerschap:

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind.

Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.

Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.

Gebruik bij borstvoeding:

Geeft u borstvoeding? Gebruik dit middel dan alleen na overleg met de verpleegkundige of arts. Waarschuw de arts als de baby slaperig of suf is en slecht drinkt.

Overige informatie

De volgende tips kunnen helpen om beter te slapen:

- Blijf overdag wakker.
- Ga op vaste tijden naar bed en sta op vaste tijden op.
- Drink geen koffie of sterke thee en eet niets meer 2 tot 3 uur voor het slapen.
- Drink geen alcohol om in te slapen. Alcohol zorgt voor een minder diepe slaap en vaker tussendoor wakker worden.
- Probeer een uur voor het slapen te ontspannen.
- Zorg voor een rustige, koele kamer met een goed bed.

Lukt het slapen dan nog niet? Doe dan iets wat afleidt en ontspant (lezen, naar rustige muziek luisteren).